

---

# GELS DE KETOPROFENE

## et risque de réactions de la peau en cas d'exposition au soleil

### Précautions importantes à connaître avant de les utiliser

---


**Ce gel de kétoprofène vous a été prescrit personnellement : vous ne devez pas le donner à une autre personne.**

Votre pharmacien vous a remis ce document pour attirer votre attention sur les précautions à prendre pour éviter la survenue de certains effets indésirables cutanés.

**En l'absence de données chez l'enfant, ce médicament est réservé à l'adulte (plus de 15 ans).**

Ce médicament, qui est appliqué sur la peau, peut réagir avec les rayons du soleil et entraîner **des réactions cutanées potentiellement graves, appelées « photosensibilisation ».**

C'est pourquoi le pictogramme suivant est présent sur la boîte et la notice de votre médicament :



Ne pas exposer les zones traitées au soleil, même voilé, ni aux U.V.A

Vous devez donc respecter ces précautions importantes :

**Pendant toute la durée du traitement et les deux semaines suivant l'arrêt, vous devez protéger la ou les zones traitée(s) du soleil (même s'il est voilé) :**

- **Portez toujours un vêtement pour couvrir la ou les zones traitée(s)**
- **Ne vous exposez pas aux rayonnements UV en solarium ou cabines de bronzage**
- Respectez la prescription de votre médecin, notamment la dose, la fréquence et la durée du traitement.

Nous vous rappelons que le gel de kétoprofène est :

- ✓ **déconseillé jusqu'à la fin du 5<sup>ème</sup> mois de grossesse**
- ✓ **ne doit jamais être utilisé à partir du début du 6<sup>ème</sup> mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) et pendant l'allaitement.**

## Précautions pour l'application du gel



- Lavez-vous soigneusement les mains et de façon prolongée après chaque application du gel, afin d'éviter tout contact involontaire avec des zones susceptibles d'être exposées au soleil.
- N'utilisez jamais ce produit sur les muqueuses, autour des yeux, ni sur une peau irritée (type eczéma), ou en cas de plaie, de brûlure, de lésion infectée ou suintante.
- Ne traitez pas de grandes surfaces, ne recouvrez pas avec un pansement occlusif.
- N'appliquez pas d'autres produits à usage dermatologique ou produits cosmétiques sur la surface traitée. Il existe un risque d'allergie croisée avec les produits contenant de l'octocrylène, une substance chimique souvent retrouvée dans des produits d'hygiène et de cosmétique, et notamment des écrans solaires ou des parfums.

### En cas d'apparition d'une réaction cutanée (rougeur, irritation, démangeaisons) :

- **arrêtez le traitement immédiatement,**
- **avertissez votre médecin,**
- **protégez cette zone du soleil même après disparition de la réaction cutanée pour éviter sa réapparition.**

Consultez la notice présente dans la boîte de votre médicament pour plus d'information. Si vous avez d'autres questions, ou si vous avez un doute, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

### Quels sont les médicaments concernés par cette information ?

Il s'agit des médicaments suivants : KETUM 2,5 %, gel ou un médicament générique.

Le nom du médicament délivré par votre pharmacien ou prescrit par votre médecin est alors celui de la substance active suivie du nom du laboratoire et du dosage.

Pour plus d'information consultez la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

### Déclarez les effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'information sur la sécurité du médicament.