

 Outil d'aide **à la titration**



FENTANYL

Comprimé sublingual

OUTIL D'AIDE À LA TITRATION

Traitement des Accès Dououreux Paroxystiques (ADP) chez les patients adultes utilisant des morphiniques pour traiter les douleurs chroniques d'origine cancéreuse.

L'Accès Dououreux Paroxystique est une exacerbation passagère d'une douleur chronique par ailleurs contrôlée par un traitement de fond.

La dose optimale de **fentanyl** (comprimé sublingual) doit être déterminée pour chaque patient par titration progressive. Les patients qui utilisent du **fentanyl** (comprimé sublingual) pour la première fois doivent commencer par un comprimé dosé à 100 µg. Un maximum de deux comprimés peut être pris à chaque épisode (1 dose). Les patients ne doivent pas recevoir plus de 4 doses (8 comprimés) de **fentanyl** (comprimé sublingual) par jour : au-delà le traitement de la douleur de fond doit être réévalué.

Tous les patients doivent commencer la phase de titration avec une dose de **100 µg de fentanyl** (comprimé sublingual).

Si le soulagement de la douleur n'est pas satisfaisant au bout de 15-30 minutes, le patient pourra prendre UNE SEULE FOIS un comprimé supplémentaire de la même dose pour traiter le même épisode d'ADP. Les patients ne doivent prendre que deux doses de **fentanyl** (comprimé sublingual) maximum par épisode d'ADP.

Les patients doivent attendre au moins 2 heures avant de traiter un autre accès de douleur paroxystique avec **fentanyl** (comprimé sublingual).


1^{er} ÉPISODE D'ADP



Après 15 à 30 minutes, la douleur est-elle soulagée ?



NON

Administer un
2^{ème} comprimé de :



OUI

Au prochain épisode, prendre un comprimé à la dose indiquée ci-dessous



Les patients doivent attendre **au moins 2 heures avant** de traiter un autre accès de douleur paroxystique avec fentanyl (comprimé sublingual).

2^{ème} ÉPISODE D'ADP

1^{er} comprimé



200 µg

Après 15 à 30 minutes, la douleur est-elle soulagée ?

NON

Administer un
2^{ème} comprimé de :



100 µg

OUI

Au prochain épisode, prendre un comprimé à la dose indiquée ci-dessous



300 µg



200 µg

Les patients doivent attendre **au moins 2 heures avant** de traiter un autre accès de douleur paroxystique avec fentanyl (comprimé sublingual).

3^{ème} ÉPISODE D'ADP

1^{er} comprimé



300 µg

Après 15 à 30 minutes, la douleur est-elle soulagée ?

NON

Administrer un
2^{ème} comprimé de :



100 µg

OUI

Au prochain épisode, prendre un comprimé à la dose indiquée ci-dessous



400 µg



300 µg

Les patients doivent attendre **au moins 2 heures avant** de traiter un autre accès de douleur paroxystique avec fentanyl (comprimé sublingual).


4^{ème} ÉPISODE D'ADP



Après 15 à 30 minutes, la douleur est-elle soulagée ?


NON

Administer un
2^{ème} comprimé de :



OUI

Au prochain épisode, prendre un comprimé à la dose indiquée ci-dessous



Les patients doivent attendre **au moins 2 heures avant** de traiter un autre accès de douleur paroxystique avec fentanyl (comprimé sublingual).

5^{ème} ÉPISODE D'ADP

1^{er} comprimé



600 µg

Après 15 à 30 minutes, la douleur est-elle soulagée ?

NON

Administrer un
2^{ème} comprimé de :



200 µg

OUI

Au prochain épisode, prendre un comprimé à la dose indiquée ci-dessous



800 µg



600 µg

Les patients doivent attendre **au moins 2 heures avant** de traiter un autre accès de douleur paroxystique avec fentanyl (comprimé sublingual).

Pour plus d'informations, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit, sur la base de données publique des médicaments :
<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr.

Pour toute demande d'information médicale, vous pouvez contacter le département d'Information Médicale au **0 800 970 109** ou sur <https://biogaran.fr/pharmacovigilance/>



BIOGARAN