

Que faut-il savoir sur RIVAROXABAN BIOGARAN® ?

- RIVAROXABAN BIOGARAN® fluidifie le sang, ce qui vous protège de la formation de caillots sanguins dangereux pour la santé.
- RIVAROXABAN BIOGARAN® doit être pris exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. N'oubliez jamais de prendre votre traitement afin d'assurer une protection optimale contre les caillots sanguins.
- Vous ne devez jamais arrêter de prendre RIVAROXABAN BIOGARAN® sans en parler d'abord à votre médecin, car le risque de formation de caillots sanguins peut être augmenté.
- Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, avant de prendre RIVAROXABAN BIOGARAN®.
- Informez votre médecin que vous êtes traité par RIVAROXABAN BIOGARAN® avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

Quand dois-je demander conseil à mon médecin ou à mon pharmacien ?

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme RIVAROXABAN BIOGARAN®, il est important de connaître les éventuels effets indésirables. Les saignements sont l'effet indésirable le plus fréquent. Si vous présentez un risque de saignement inhabituel, ne commencez pas à prendre RIVAROXABAN BIOGARAN® sans en avoir parlé d'abord avec votre médecin.

Prévenez immédiatement votre professionnel de santé si vous présentez des signes ou des symptômes de saignements tels que :

- douleurs,
- gonflement ou sensations d'inconfort,
- maux de tête, sensations vertigineuses ou faiblesse,
- ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements du nez, saignements des gencives, ou saignement d'une plaie difficile à stopper,
- menstruations (règles) ou saignements vaginaux plus abondants que d'ordinaire,

- sang dans les urines pouvant les colorer en rose ou marron, selles rouges ou noires,
- si vous crachez du sang, ou vomissez du sang ou des substances ressemblant à du marc de café.

Comment dois-je prendre RIVAROXABAN BIOGARAN® ?

- Pour garantir une protection optimale, RIVAROXABAN BIOGARAN®
 - 10 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas,
 - 15 mg doit être pris au cours des repas,
 - 20 mg doit être pris au cours des repas.

Carte de surveillance du patient

- RIVAROXABAN BIOGARAN® 10 mg
- RIVAROXABAN BIOGARAN® 15 mg
- RIVAROXABAN BIOGARAN® 20 mg

- **Gardez toujours cette carte sur vous**
- **Montrez cette carte à tout médecin ou dentiste que vous consultez avant de commencer un traitement**



Je suis sous traitement anticoagulant par RIVAROXABAN BIOGARAN®.

Nom : _____

Adresse : _____

Date de naissance : _____

Poids : _____

Autres médicaments/pathologies : _____

En cas d'urgence, veuillez prévenir

Nom du médecin : _____

Téléphone du médecin : _____

Cachet du médecin : _____

Veuillez aussi prévenir

Nom : _____

Téléphone : _____

Lien avec le patient : _____

Information à destination des professionnels de santé :

- Les valeurs de l'INR ne doivent pas être utilisées car elles ne représentent pas une valeur fiable de la mesure de l'activité anticoagulante de RIVAROXABAN BIOGARAN®.